

骨痛熱症1週增183宗 隆逾月1851病例2死

(吉隆坡19日讯)在1月28日至2月3日,短短一周,吉隆坡新增183宗骨痛熱症!

据英文《星报》,截至上述周期,目前吉隆坡累计1851宗骨痛熱症病例,比去年同期的1071宗增加了72.8%或780宗。

在这段时间,有2宗死亡病例和22个热点区。

根据吉隆坡国会选区数据,士布爹累计最多病例里,为250宗,接著是敦拉萨镇240宗、蕉赖209宗和泗岩沫208宗。

吉隆坡市政局发言人指出,骨痛熱症热点区多是位于建筑工地、商业区或空置房屋。

22熱點區

他说,屋顶排水沟、水箱、塑料桶、旧轮胎、花盆、小容器和排水沟等有积水的地方都是黑斑蚊产卵的完美场所,然而许多居民并没有这方面的意识。

“黑斑蚊很有可能在感染骨痛熱症的人的住家或周围地区繁殖。”

市政局通过其卫生和环境卫生部门,一直在开展各种骨痛熱症控制和预防活动,例如摧毁繁殖地、使用杀虫剂、消除可能促进蚊子繁殖的元素、雾化、超

量雾化(ULV)和 对学校和建筑工地进行例行检查。

当局检查了1万6000 多个潜在的繁殖地点,发现885个物品和 277个场所有黑斑蚊幼虫,在接受视察的55 所学校中,有23所学校有黑斑蚊幼虫。

市政局派遣其卫生部门的特别行动小组检查吉隆坡正在施工的建筑工地,在检查的18个建筑工地中,15个被确定为黑斑蚊繁殖地,1个工地被关闭。



■积水的花盆是黑斑蚊繁殖温床之一。(取自吉隆坡市政局面子书)



■承包商员工在骨痛熱症热点区喷蚊雾。(取自《星报》)

疫情區進行風險評估

市政局与联邦直辖区吉隆坡和布城卫生局合作,在高风险疫情地区进行例行风险评估,以确定骨痛熱症长期传播的原因和风险。

这项风险评估活动被称为骨痛熱症疫情风险评估(Dora),自今年年初以来已进行了7次。

进行过 骨痛熱症疫情风险评估的地点包括Sri Penara 公寓、Warisan City View Phase 2、Ixora 公寓、Cengal公

寓、Pelangi Indah 公寓、帝沙花园、帝沙蕉赖 A (1/154D至5/154D路)和美家组屋2B。

市政局与居民和当地社区一起组织项目,共同对抗骨痛熱症的传播,相信通过各方合作,确保住宅区和周边地区清洁且没有积水,可以在吉隆坡消除骨痛熱症。

自2023年迄今,市政局已与吉隆坡各地的社区进行了84次社区清洁活动。